星空丶梦幻丶蜜桃,警惕虚假宣传、全面解答与解释爱豆百科、带你重温经典舞蹈与音乐魅力！

猪场发现有非洲猪瘟怎么办?

发现猪场有非洲猪瘟时，应立即采取隔离、无害化处理、消毒、阻断传播途径、优化饲养管理及细节把控等综合措施，具体如下：隔离病猪：非洲猪瘟有一定潜伏期，发现猪出现发烧、食欲不振、呼吸困难等异常状态时，需立即将病猪隔离，防止传染给其他健康生猪。

使用密闭运输工具转移病死猪，避免泄漏。处理点需远离猪场，选择地势高、地下水位低的区域，按《病死及病害动物无害化处理技术规范》操作。生物安全强化与消毒措施全场消毒 消毒剂选择：使用过硫酸氢钾复合物、戊二醛等对非洲猪瘟病毒有效的消毒剂，轮换使用防止耐药性。

猪场发生疑似非洲猪瘟时，应立即采取隔离、淘汰、消毒及免疫增强等综合措施，同时依据症状和剖检结果快速判断并处理。 具体操作如下：快速判断疑似非洲猪瘟临床观察：若猪群出现发病率、死亡率骤增或无征兆突然死亡，需高度警惕。

发病后应急处置措施- 快速隔离管控：发现疑似病例后，立即将病猪转移至3公里外的隔离舍，安排专用饲养人员管理，严禁与健康猪群共用工具、通道；立刻暂停场内猪只调运、饲料及物资的场外运输，对猪场出入口进行24小时值守管控。

猪场一旦出现非洲猪瘟，必须立即采取严格的综合防控措施，核心在于快速阻断病毒传播、彻底消毒和无害化处理病死猪，同时配合相关部门做好疫情报告和排查工作。理解了非洲猪瘟的极强传染性和高致死率后，我们自然要转向最紧迫的行动方案。

非洲猪瘟疫情后的猪场消毒处理核心步骤： 全面扑杀后处置 立即对病死猪、同群猪进行无害化处理（深埋或焚烧），处理点需撒布生石灰或2%氢氧化钠溶液，深度不低于2米，掩埋后地面再次消毒。

广东雷州发生一起猪口蹄疫疫情,这种疫情潜伏期有多久?

猪口蹄疫的潜伏期为周期性发生，通常三到四年的时间会出现一次，对于猪群而言潜伏周期为二十天至一个月的时间，对于个体而言潜伏期为十五天左右。

据农业农村部畜牧兽医局7月13日消息，7月11日，经广东省动物疫病预防控制中心确诊，广东省湛江市雷州市发生一起猪口蹄疫疫情。该批猪共131头，发病39头，死亡1头。疫情发生后，当地正在按照防治技术规范要求和有关预案做好疫情处置工作。

这段时间，在广东省雷州市发生了一起猪口蹄疫疫情，在7月7日的时候，雷州市在生猪私屠滥宰联合执法行动中查扣两辆运输车、131头无检疫合格证明且全部未佩带耳标的外地生猪，并在这批查处的外来偷运生猪中发现一起猪口蹄疫疫情。经广东省动物疫病预防控制中心确诊，发病39头，死亡1头。

四川闹猪瘟是90年代吗

四川并非仅在90年代闹过猪瘟，不同年份均发生过相关疫情，90年代并非四川猪瘟疫情的集中或典型时期。近年典型疫情案例 2005年猪链球菌疫情2005年8月，四川省资阳、内江两地发生猪链球菌Ⅱ型疫情，导致生猪大量死亡，并造成人员感染。此次疫情共报告204例人感染病例，其中38人死亡，引发社会

广泛关注。

四川目前对非洲猪瘟防控采取严格调运管制，核心原则是点对点调运严审批、严监管，违规调运依法严处。具体规定根据疫情态势动态调整，目前跨省调运方面，在国内疫情未解除封锁前，暂停省外生猪和生猪产品调运入川。

四川省已有13家企业被列为国家级非洲猪瘟无疫小区，数量位居西南区第一。

非洲猪瘟（ASF）在四川省的疫情确实存在，尤其是在南部和平原地区较为严重，疫情比例达到20至30%。 山区由于自然屏障的存在，疫情相对较轻。
非洲猪瘟是一种由非洲猪瘟病毒引起的急性、热性、接触性传染病，主要影响猪只。

四川已经完全禁止从省外运输生猪，以防控非洲猪瘟疫情。出台促进生猪生产保障市场供应的九条措施，包括实行生猪生产红线，对各市（州）生猪出栏量制定任务目标等。法律责任：跨省运输、贩卖非洲猪瘟病猪的行为涉嫌妨害动植物防疫、检疫，最高可处三年有期徒刑。

猪瘟疫情能吃猪肉吗

总之，只要是通过正规途径购买的经过检验检疫的猪肉，是可以放心食用的，不必因为存在猪瘟疫情就对猪肉过度恐慌。

猪瘟疫情期间，不建议食用未经检疫的猪肉，但经过正规渠道检疫合格的猪肉是可以安全食用的。首先，猪瘟是一种高度传染性的动物疾病，病猪体内会携带大量的病毒和细菌。如果人食用了病死的猪肉，存在极大的健康风险，可能会导致严重的疾病，包括但不限于食物中毒、胃肠道感染，甚至更严重的传染病。

非洲猪瘟猪肉经规范处理可安全食用，但需注意疫情防控要求核心安全结论
病毒特性：非洲猪瘟不是人畜共患病，不会感染人类，历史上无人类感染病例。 食用条件：被感染猪肉经60℃以上持续加热30分钟（彻底煮熟煮透）后，病毒可完全灭活，对人体无危害。

内蒙发生非洲猪瘟疫情，但猪肉可以正常食用。 非洲猪瘟不是人畜共患病，不感染人，对人体健康和食品安全不产生直接影响，具体说明如下：非洲猪瘟的特性：非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病。猪主要通过接触病毒或者污染物或被感染的蜱叮咬后而感染，其潜伏期为15天。

非洲猪瘟病毒在60度以上的高温环境下可以被杀死，因此通过正规渠道购买、经过高温处理的猪肉可以放心食用。猪肉的安全性：疫区内所有感染非洲猪瘟的猪已经全部无害化处理，农业农村部已暂停疫区范围的生猪向外调运，防止疫情扩散。只要疫情得到有效控制，且通过正规渠道购买猪肉，就可以放心食用。

非洲猪瘟爆发时，经过规范处理和烹饪的猪肉可以安心食用。以下是具体分析：非洲猪瘟病毒特性传播范围：非洲猪瘟病毒（ASFV）只传染猪，不传染人和其他动物，因此人类不会因食用猪肉感染该病毒。病毒耐热性：该病毒并不耐热，在55℃下持续30分钟或在60℃下持续10分钟即可被杀灭。

如何看待19年底的非洲猪瘟疫?

〖One〗、疫情的严重性与传播特点症状典型，致死率高：非洲猪瘟以高烧、厌食、全身发红、耳朵发绀、皮肤坏死点、出血、脾脏肿大、肠道出血为典型症状，且致死率极高，对生猪养殖业构成毁灭性打击。传播迅速，难以控制：尽管交通闭塞，但疫情仍快速扩散，反映出病毒传播的隐蔽性与高效性

。

〖Two〗、这样处理的有两种结果。第一种结果，是剩下的生猪也没能养活，养到后面，所有的生猪都感染非洲猪瘟病死了，这是大部分情况。这使得这些生猪养殖户，损失更大，因为后期还损失了不少的猪饲料，我们知道的猪饲料一直都是那么的贵。

〖Three〗、缺乏垂直管理的动物卫生监管体系非洲猪瘟折射出中国缺乏一套自上而下垂直管理的动物卫生监管体系以及养殖户的财政保证制度。动物防疫体系脆弱，加强养殖行业的规范和管理刻不容缓。

〖Four〗、一旦养殖场的猪感染，往往意味着大量生猪死亡，给养殖户带来毁灭性打击。例如，许多养殖户的猪成群死亡，原本健康的好猪也难以幸免，导致养殖场生猪数量急剧减少，甚至清空。

〖Five〗、需求疲软，价格维持弱势震荡，12月1日较年内高点333元/公斤下跌143%。核心数据表现全年生猪均价暴涨2617%，11月1日达到历史高点333元/公斤。全国生猪存栏31041万头，同比下降25%；出栏54419万头，同比下降26%；猪肉产量4255万吨，同比下降23%。

〖Six〗、针对非洲猪瘟防控的严峻复杂形势，近期农业农村部面向全国所有养殖场户和动物防疫人员，举办“全国非洲猪瘟防控和复养技术大讲堂”远程培训，提高防控能力。将根据防控形势变化，及时调整优化非洲猪瘟疫情处置方案，继续督促指导各地落实好各项防控措施，努力降低疫情传播和发生风险，确保疫情不反弹。

得了猪瘟怎么办

综上所述，得了猪瘟后应立即采取紧急接种猪瘟细胞苗疫苗的措施，并对病猪进行隔离和治疗。同时，加强猪场管理，做好消毒和生物安全工作，以防止猪瘟疫情的进一步扩散。

猪得了猪瘟怎么办 当猪群中有一只猪得了猪瘟时，首先要对猪群进行排查隔离。特别是身体弱的或者年龄比较小的猪一定要隔离。对猪舍要彻底的清理，这样才能保证室内环境整洁，避免病毒的扩散。

目前，对于该病还没有有效的治疗方法，主要靠平时的预防。具体措施有：①定期预防注射，每年春、秋两季，除对成年猪普遍进行一次猪瘟兔化弱毒疫苗注射外，对断奶仔猪及新购进的猪都要及时防疫注射。

可适当使用退烧药物；对于拉稀严重的猪只，应给予止泻药物等。营养支持：在治疗过程中，还应加强猪只的营养支持，提高其抵抗力。可以给予高蛋白、高能量的饲料，以及适量的维生素和矿物质等营养物质。

得了猪瘟应立即采取以下措施：紧急接种猪瘟疫苗：对于已感染猪瘟的猪群，应立即进行紧急接种猪瘟细胞苗疫苗。大猪接种50头份，小猪接种25头份，以控制疫情的进一步扩散。隔离病猪：将表现出猪瘟症状的病猪立即隔离，防止病毒通过接触传播给其他健康猪只。